

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA

RIESGO ESTÁNDAR

Se me ha explicado que mi hijo(a) padece de una leucemia/linfoma linfoblástico (un tipo de cáncer). El tratamiento consiste en quimioterapia sistémica y quimioterapia intratecal. Se espera que este tratamiento sea beneficioso, resultando en una mejoría o remisión de la enfermedad (estar libre de la enfermedad).

La Quimioterapia se administrará de la siguiente manera:

Inducción (los primeros 35 días):

Vincristina inyectada en una vena (IV), una vez a la semana, durante 4 semanas (días 1, 8, 15 y 22). Nueve dosis de asparaginasa inyectada en el muslo (IM) o en la vena (IV). Dexametasona oral durante 28 días. Quimioterapia intratecal con citarabina el día 1 y con metotrexato los días 8 y 29.

Consolidación:

Consolidación: Los siguientes 28 días recibirá mercaptopurina (Purinethol) oral cada día; metotrexato intratecal cada semana durante 3 semanas (días 1, 8 y 15) y vincristina IV la primera semana.

Mantenimiento interino I: Recibirá 5 dosis de vincristina IV y metotrexato IV cada 10 días (días 1, 11, 21, 31 y 41) y metotrexato intratecal el día 31.

Intensificación Tardía: En los días 1-28 (“reinducción”), recibirá vincristina IV y doxorubicina (Adriamicina) IV una vez a la semana, durante 3 semanas (días 1, 8 y 15); una dosis de pegaspargase o 6 dosis de asparaginasa IM o IV a partir del día 4, y dexametasona oral durante 7 días dos veces (días 1-7 y 15 a 21). Los siguientes 28 días (“reconsolidación”), recibirá una dosis de ciclofosfamida IV (día 1); citarabina IV o subcutánea cada día por 4 días a la semana durante dos semanas (días 29-32 y 36-39); tioguanina o mercaptopurina durante 14 días (días 29-42), y metotrexato intratecal (días 1 y 29).

Mantenimiento interino II: Recibirá 5 dosis de vincristina IV y metotrexato IV cada 10 días (días 1, 11, 21, 31 y 41) y metotrexato intratecal los días 1 y 31.

Mantenimiento: Recibirá una dosis de vincristina IV y dexametasona oral durante 5 días cada 12 semanas; mercaptopurina oral cada día; metotrexato oral cada semana; y quimioterapia intratecal con metotrexato cada 12 semanas, durante 2 años.

Tanto la leucemia como el tratamiento con quimioterapia se asocian a efectos secundarios y complicaciones.

Los médicos lo estaremos siguiendo de cerca para ver si cualquiera de estos efectos secundarios ocurre. Se harán exámenes físicos de rutina, pruebas de laboratorio y estudios

radiográficos para monitorizar los efectos del tratamiento. Los efectos secundarios generalmente desaparecen luego de concluir el tratamiento. Mientras tanto, los médicos podemos recetarle medicinas para mantener estos efectos secundarios bajo control. En caso de tener algún efecto secundario del tratamiento, se le brindará atención médica.

Si la enfermedad empeorara, si los efectos secundarios fueran muy severos o si nuevos avances científicos descubrieran mejores tratamientos, el tratamiento se suspendería y se discutiría un nuevo tratamiento.

Una alternativa a este tratamiento es no darle más tratamientos, pero esto resultaría en la progresión de la enfermedad.

He leído este consentimiento,

Padres/Guardián

Fecha

Paciente

Médico